

# GESTION D'UN CAS DE COVID

Des **symptômes** ➡ se déclarent en animation, quel que soit l'âge :

1. Isoler la personne (medical room)
2. Appel à la fédé
3. Contacter les parents pour qu'ils viennent rechercher la personne
4. Prendre soin de la personne en portant un masque
5. Désinfecter et aérer le local de quarantaine
6. Les parents contactent le médecin

- Pour chaque situation, tu verras qu'il y a une lettre type spécifique à donner aux parents du groupe.
- Les impacts sur le groupe sont à prendre en considération si la personne a été en contact 2 jours avant les symptômes ou moins.
- Suivant la conférence interministérielle Santé publique du 19/10, on ne teste plus les personnes asymptomatiques jusqu'au 15/11/20. Cependant, si un foyer de contagion (cluster) se déclare dans un Patro, il est possible que des tests se réalisent sur des personnes asymptomatiques.

### Enfant avec symptômes de 4-6 ans

Impact sur la personne	Impact sur son groupe	Impact autres groupes
Le médecin décide de tester ou non et donne son avis sur son retour	Les activités continuent pendant l'attente du test	
Pas de test : peut revenir sur avis du médecin	Les activités continuent	
Test - : peut revenir sur avis du médecin		
Test + : Peut revenir 7j après apparition des symptômes et pas de fièvres pendant les 3 derniers J	<ul style="list-style-type: none"> <li>→ Les activités sont suspendues pendant 10j après dernier contact, encadrants compris.</li> <li>→ Pas de quarantaine ni de test si pas de symptômes.</li> <li>→ <b>Courrier 1</b> ➡</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>→ Les activités continuent</li> <li>→ Vigilance pendant 10J</li> </ul>
	Si symptômes : Test - : peut revenir après 10J	
	Refus du test, test impossible : Quarantaine de 10J	
	Test + : cluster → <b>Courrier 3</b> ➡	

### Enfant avec symptômes de 6-12 ans

Impact sur la personne	Impact sur son groupe	Impact autres groupes
Test et isolement jusqu'au résultat	Les activités continuent pendant l'attente du test	
Test - : peut revenir sur avis du médecin	Les activités continuent	
Test + : Peut revenir 7j après apparition des symptômes et pas de fièvres pendant les 3 derniers J	<ul style="list-style-type: none"> <li>→ Les activités sont suspendues pendant 10j après dernier contact, encadrant(s) compris.</li> <li>→ Pas de quarantaine ni de test si pas de symptômes.</li> <li>→ <b>Courrier 4</b> ➡</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>→ Les activités continuent</li> <li>→ Vigilance pendant 10J</li> </ul>
	Si symptômes : Test - : peut revenir après 10J	
	Refus du test, test impossible : Quarantaine de 10J	
	Test + : cluster → <b>Courrier 7</b> ➡	

Jeunes avec symptômes de 12-18 ans		
Impact sur la personne	Impact sur son groupe	Impact autres groupes
<b>DISTANCE PHYSIQUE OU PORT DU MASQUE RESPECTÉS</b>		
Test et isolement jusqu'au résultat	Les activités continuent pendant l'attente du test	
Test - : peut revenir sur avis du médecin	Les activités continuent	
Test + : Peut revenir 7j après apparition des symptômes et pas de fièvres pendant les 3 derniers J	<ul style="list-style-type: none"> <li>→ Les activités sont suspendues pendant 10j après dernier contact, encadrant(s) compris.</li> <li>→ Pas de quarantaine ni de test si pas de symptômes.</li> <li>→ <b>Courrier 8</b> →</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>→ Les activités continuent</li> <li>→ Vigilance pendant 10J</li> </ul>
	Si symptômes : Test - : peut revenir après 10J	
	Refus du test, test impossible : Quarantaine de 10J	
	Test + : cluster → <b>Courrier 12</b> →	
<b>DISTANCE PHYSIQUE OU PORT DU MASQUE NON RESPECTÉS PENDANT + DE 15 MINUTES</b>		
Test et isolement jusqu'au résultat	Quarantaine directe	→ Les activités continuent
Test - : peut revenir sur avis du médecin	Les activités continuent	→ Vigilance pendant 10J
Test + : Peut revenir 7j après apparition des symptômes et pas de fièvres pendant les 3 derniers J	<ul style="list-style-type: none"> <li>→ Quarantaine de 10J</li> <li>→ Pas de test si pas de symptômes.</li> <li>→ Vigilance pendant les 7J de reprises d'activités</li> <li>→ <b>Courrier 9</b> →</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>→ Les activités continuent</li> <li>→ Vigilance pendant 10J</li> </ul>
	Si symptômes : Test - : peut revenir après 10J	
	Refus du test, test impossible : Quarantaine de 10J	
	Test + : cluster → <b>Courrier 12</b> →	

## Encadrants avec symptômes

Impact sur la personne	Impact sur son groupe d'animation			Impact autres groupes
	4-6	6-12	12-18	
Test et isolement jusqu'au résultat	Les activités sont suspendues	<b>DISTANCE OK</b>	<b>DIST./MASQUE OK</b>	Les activités continuent
Test - : peut revenir sur avis du médecin	<ul style="list-style-type: none"> <li>→ Les activités continuent</li> <li>→ Vigilance pendant 10J</li> </ul>	Les activités continuent		
Test + : Peut revenir 7j après apparition des symptômes et pas de fièvres pendant les 3 derniers J	<ul style="list-style-type: none"> <li>→ Quarantaine de 10J</li> <li>→ Pas de test si pas de symptômes.</li> <li>→ Vigilance pendant les 4J de reprises d'activités.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>→ Les activités sont suspendues pendant 10j après dernier contact, encadrant(s) compris.</li> <li>→ Pas de quarantaine ni de test si pas de symptômes.</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>→ Les activités continuent</li> <li>→ Vigilance pendant 10J</li> </ul>
	→ <b>Courrier 2</b> →	<b>Courrier 5</b> →	<b>Courrier 10</b> →	
	Si symptômes : Test - : peut revenir après 10J	Si symptômes : Test - : peut revenir après 10J		
	Refus du test, test impossible : Quarantaine de 10J	Refus du test, test impossible : Quarantaine de 10J		
	Test + : quarantaine de 10J	Test + : cluster		
	→ <b>Courrier 3</b> →	→ <b>Courrier 7</b> →	→ <b>Courrier 12</b> →	
Test et isolement jusqu'au résultat		<b>DISTANCE KO</b>	<b>DIST./MASQUE KO</b>	
Test - : peut revenir sur avis du médecin		Quarantaine directe		
Test + : Peut revenir 7j après apparition des symptômes et pas de fièvres pendant les 3 derniers J		<ul style="list-style-type: none"> <li>→ Quarantaine de 10J</li> <li>→ Pas de test si pas de symptômes.</li> <li>→ Vigilance pendant les 4J de reprises d'activités</li> </ul>		
		→ <b>Courrier 6</b> →	→ <b>Courrier 11</b> →	
		Si symptômes : Test - : peut revenir après 10J		
		Refus du test, test impossible : Quarantaine de 10J		
	Test + : cluster			
	→ <b>Courrier 7</b> →	→ <b>Courrier 12</b> →		

### Cohabitant d'un cas positif

Symptomatique	Asymptomatique	Impact sur le groupe
<ul style="list-style-type: none"><li>→ Peut revenir 7j après apparition des symptômes et pas de fièvres pendant les 3 derniers J</li><li>→ Si refus de test ou test impossible : quarantaine de 10J</li><li>→ (4-6 ans pas testé)</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>→ Peut revenir 7J après la fin de l'isolement du contact.</li><li>→ Vigilance pendant les 7J de reprises d'activités</li></ul>	Les activités continuent

### Retour de zone rouge

Symptomatique	Asymptomatique	Impact sur le groupe
<ul style="list-style-type: none"><li>→ Test + : Peut revenir 7j après apparition des symptômes et pas de fièvres pendant les 3 derniers J</li><li>→ Refus de test ou test impossible : quarantaine de 10J</li><li>→ (4-6 ans pas testé)</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>→ Quarantaine de 10J</li><li>→ Pas de test si pas de symptômes.</li><li>→ Vigilance pendant les 4J de reprises d'activités</li></ul>	Les activités continuent

# TA POSTURE EN TANT QU'ANIMATEUR EN CAS DE SUSPICION DE CAS

1

En priorité, je garde mon calme. Je sais que je ne suis pas seul pour gérer la situation. J'ai confiance en moi et en mon équipe de cadres. Je sais que je peux faire appel à la fédération via le numéro **071/28.69.50** pour expliquer la situation et recevoir des conseils.

2

J'informe le participant mis en quarantaine de la situation. Je le rassure en rappelant qu'il s'agit de mesures de précaution sur base de quelques symptômes et que ses parents viendront rapidement le rechercher. Je veille à ce qu'il vive le mieux possible la situation. Je lui donne de l'occupation. Je veille à sa santé et à son bien-être. Je lui apporte de quoi boire et manger. J'essaye de rendre le lieu de quarantaine le plus agréable et confortable possible.

J'informe également le reste du groupe de la situation. Je suis rassurant. Je réponds aux questions et aux inquiétudes. J'explique le principe d'une quarantaine et l'importance d'éviter les contacts

3

Je veille à informer les parents. Je leur donne des nouvelles rassurantes de leur enfant. Je leur explique la procédure qui est mise en place et le fait que je suis accompagné par la fédération. Je leur demande de garder l'information pour eux dans un premier temps pour éviter un vent de panique dans les autres familles. Celles-ci seront informées en temps voulu par tes soins.

# IDENTIFICATION DES SYMPTÔMES LIÉS AU CORONAVIRUS

Les symptômes liés au Covid-19 sont nombreux et peu spécifiques. Tu dois donc garder à l'esprit qu'un animé qui ne se plaint que d'un rhume peut participer aux activités du patro.

Tu trouveras ci-dessous les différentes situations dans lesquelles un animé (ou un animateur) doit rester à domicile et contacter son médecin traitant.

Moins de 18 ans	Plus de 18 ans			Reprise des activités
<ul style="list-style-type: none"> <li>→ 38° et plus de fièvre (sauf si la cause est connue, vaccination par exemple)</li> <li>→ Toux ou difficulté respiratoire (sauf si la cause est connue, asthme par exemple)</li> <li>→ Rhume avec possible petite toux et éternuements ET autres symptômes (douleurs musculaires, fatigue inhabituelle, maux de gorge, maux de tête, manque d'appétit)</li> </ul>	<b>Au moins 1 des symptômes majeurs suivants sans autre cause évidente</b>	<b>Au moins 2 des symptômes mineurs suivants sans autre cause évidente</b>	<b>OU</b>	Un participant mineur ou majeur COVID-19 confirmé ou possible, présentant des symptômes légers, sans hospitalisation, peut reprendre les activités du patro 7 jours après le début des symptômes, à deux conditions : <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Qu'il n'ait pas eu de fièvre au cours des trois derniers jours.</li> <li>2. Qu'il ait montré une amélioration considérable des symptômes.</li> </ol> Pour les participants ayant été hospitalisés en raison d'une des formes majeures de COVID-19, la durée de l'isolement au domicile suite à la sortie d'hospitalisation et donc la date possible de reprise des activités patro sera déterminée par le médecin traitant.

# IDENTIFICATION DES CONTACTS

Sciensano - MESURES POUR LES CONTACTS D'UNE PERSONNE AVEC COVID-19  
(version du 01/10/20)

## Contacts à haut risque ou contacts étroits

Le risque de contamination est considéré comme « élevé » pour les personnes citées ci-dessous. Ces personnes sont appelées « contacts étroits » dans le reste de cette procédure :

- Une personne avec un contact cumulatif d'au moins 15 minutes à une distance de < 1,5 m, face à face<sup>4</sup>, par exemple lors d'une conversation, sans port du masque adéquat (couvrant le nez et la bouche) par un des deux personnes. Cela comprend, entre autres, les cohabitants, les enfants d'un même groupe résidant dans une collectivité, des personnes avec lesquelles on a partagé un repas et éventuellement des voisins au travail.
- Une personne qui a eu un contact physique direct avec un cas COVID-19.
- Une personne qui a eu un contact direct avec des excréments ou fluides corporels d'un patient COVID-19, par exemple pendant les embrassades ou le bouche à bouche, ou un contact avec des vomissements, selles, glaires etc.
- Une personne identifiée comme contact étroit par l'application « Coronalert ».
- Une personne qui a voyagé avec un patient COVID-19 pendant plus de 15 minutes, dans n'importe quel moyen de transport, assis à deux sièges de distance (dans n'importe quelle direction) du patient. [...]

## Contacts à faible risque

Le risque de contamination est considéré comme « faible » pour les personnes suivantes :

- Une personne qui a eu plus de 15 minutes de contact avec un patient COVID-19 à une distance de <1,5 m (face à face) mais avec port de masque adéquat (couvrant le nez et la bouche) par les deux personnes.
- Une personne qui a eu moins de 15 minutes de contact avec un patient COVID-19 à une distance de <1,5 m (face à face).
- Une personne qui se trouvait dans la même pièce / environnement fermé avec un patient COVID-19 pendant plus de 15 minutes mais où la distance de > 1,5 m a été respectée. Cela comprend entre autre des personnes qui travaillent dans la même pièce<sup>5</sup>, ou dans une salle d'attente.

<sup>4</sup>En cas de séparation complète par une paroi en plexiglas, ceci n'est pas considéré comme un contact face à face.

<sup>5</sup>En dehors des voisins proches si une distance de 1,5 m n'était pas respectée



## Autres situations

- Pour les enfants (milieu d'accueil, école maternelle et école primaire), la classification du risque dépend notamment de l'âge du cas index. Plus d'explications sont disponibles dans la procédure enfants.
- Un voyageur revenant d'une zone rouge où il a séjourné plus de 48h et où le formulaire d'auto-évaluation indique un risque élevé, suit la même procédure qu'un contact à haut risque.

# RÉSUMÉ DES DIFFÉRENTS COURRIERS

A chaque situation son courrier	Un autre animé est Covid+	Un animateur est Covid+	Cluster ! Plusieurs cas Covid+	
<b>Courrier pour les moins de 6 ans</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>→ <b>Courrier 1</b> ➡</li> <li>→ Ecole ok mais <del>patro</del></li> <li>→ Mesures de précaution</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>→ <b>Courrier 2</b> ➡</li> <li>→ Ecole et <del>patro</del></li> <li>→ Mesures de précaution</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>→ <b>Courrier 3</b> ➡</li> <li>→ Ecole et <del>patro</del></li> <li>→ Mesures de précaution</li> </ul>	
<b>Courrier pour les 6 à 12 ans</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>→ <b>Courrier 4</b> ➡</li> <li>→ Ecole ok mais <del>patro</del></li> <li>→ Mesures de précaution</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>→ <b>Courrier 5</b> ➡</li> <li>→ Contact faible risque</li> <li>→ Ecole ok mais <del>patro</del></li> <li>→ Mesures de précaution</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>→ <b>Courrier 6</b> ➡</li> <li>→ Contact haut risque</li> <li>→ Ecole et <del>patro</del></li> <li>→ Mesures de précaution</li> <li>→ Test si symptômes</li> <li>→ Médecin</li> </ul>	
<b>Courrier pour les plus de 12 ans</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>→ <b>Courrier 8</b> ➡</li> <li>→ Contact faible risque</li> <li>→ Ecole ok mais <del>patro</del></li> <li>→ Mesures de précaution</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>→ <b>Courrier 9</b> ➡</li> <li>→ Contact haut risque</li> <li>→ Ecole et <del>patro</del></li> <li>→ Mesures de précaution</li> <li>→ Test si symptômes</li> <li>→ Médecin</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>→ <b>Courrier 10</b> ➡</li> <li>→ Contact faible risque</li> <li>→ Ecole ok mais <del>patro</del></li> <li>→ Mesures de précaution</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>→ <b>Courrier 11</b> ➡</li> <li>→ Contact haut risque</li> <li>→ Ecole et <del>patro</del></li> <li>→ Mesures de précaution</li> <li>→ Test si symptômes</li> <li>→ Médecin</li> </ul>
			<ul style="list-style-type: none"> <li>→ <b>Courrier 12</b> ➡</li> <li>→ Ecole et <del>patro</del></li> <li>→ Mesures de précaution</li> <li>→ Test si symptômes</li> <li>→ Médecin</li> </ul>	



Animés  
de moins  
de 6 ans



Autre  
animé  
Covid+



Tous les  
cas de  
figure



Responsables  
légaux de  
l'animé

Chers parents,

**Un enfant qui fréquente le groupe de votre enfant présente une infection Covid-19.** La transmission du virus entre enfants d'âge maternel ou primaire est estimée comme faible par les experts. Suite à l'analyse de la situation qui a été faite par le responsable de la santé et des soins, **votre enfant est estimé comme étant à faible risque** d'avoir été contaminé. **Il peut donc continuer à fréquenter l'école, l'école de devoirs, l'accueil extrascolaire avant, après l'école et le mercredi après-midi.**

Néanmoins, quelques mesures de précautions sont nécessaires pour suivre son état de santé et éviter la propagation du virus. Voici les consignes à suivre durant les **14 jours** qui suivent le dernier contact avec la personne infectée, à savoir **jusqu'au ...../...../..... inclus** :

- Il est recommandé de **réduire au minimum les autres contacts sociaux** pendant 14 jours, en respectant une distance de 1,5m, et d'**éviter les contacts avec les personnes à risque** de développer des formes plus sévères de la maladie comme par exemple les personnes de l'entourage familial âgées de plus de 65 ans (grands-parents) ou porteurs d'une maladie chronique. De même, **les activités extra-scolaires**, loisirs, académies doivent être évitées. **Dès lors, nous suspendons sa participation aux activités du patro durant 14 jours et celle-ci reprendra le ...../...../.....**
- Veillez au respect des **mesures d'hygiène** (se laver les mains plusieurs fois par jour à l'eau et au savon ; éternuer dans un mouchoir jetable, immédiatement jeté dans une poubelle fermée avec lavage des mains juste après ; ne pas partager les ustensiles pour manger et boire, ni les brosses à dents ou les essuies) et autant que possible de **distanciation physique** (se tenir à 1,5m des autres, éviter les contacts directs et les échanges d'objets).
- Vous devrez **être attentif et surveiller l'apparition éventuelle de tout symptôme** tels que : fièvre, autres plaintes d'infection virale aiguë (toux, difficultés respiratoires, rhume, maux de gorge, fièvre, maux de tête, douleurs musculaires, douleur thoracique, perte d'odorat ou de goût, diarrhée aqueuse sans cause apparente) ou aggravation de symptômes respiratoires chroniques (asthme, toux chronique, allergie). **En cas d'apparition d'un symptôme**, contactez votre médecin par téléphone pour l'informer des symptômes et du contact récent, et voir avec lui si un test est requis.
- Un test systématique chez un enfant fréquentant l'école maternelle qui ne présente pas de symptôme n'est pas indiqué.

Nous restons à votre disposition pour toute question à ce sujet.

**Signature :**



Chers parents,

**Un animateur qui fréquente le groupe de votre enfant présente une infection Covid-19.** Votre enfant fait partie de ceux qui ont eu des **contacts étroits** avec cette personne. Cela ne signifie pas que votre enfant a été contaminé, mais qu'il est à risque de porter le virus. **Tous les enfants dans ce cas** doivent donc être mis **en quarantaine** à la maison pour une durée de **10 jours à partir du dernier contact à risque**, même s'ils ne sont pas malades. Cette mesure vise à surveiller leur état de santé, et empêcher la transmission du virus à d'autres personnes. Dès lors :

- Votre enfant **doit être en quarantaine jusqu'au ...../...../..... inclus.**
- Il peut ensuite, au 8<sup>ème</sup> jour, retourner à l'école, et fréquenter l'accueil extrascolaire avant, après l'école et le mercredi après-midi.

Voici les consignes à suivre durant les **14 jours** qui suivent le dernier contact avec la personne infectée, à savoir **jusqu'au ...../...../.....** :

- Il est recommandé de **réduire au minimum les autres contacts sociaux** pendant 14 jours, en respectant une distance de 1,5m, et d'**éviter les contacts avec les personnes à risque** de développer des formes plus sévères de la maladie comme par exemple les personnes de l'entourage familial âgées de plus de 65 ans (grands-parents) ou porteurs d'une maladie chronique. De même, **les activités extra-scolaires**, loisirs, académies doivent être évitées. **Dès lors, nous suspendons sa participation aux activités du patro durant 14 jours et celle-ci reprendra le ...../...../.....**
- Veillez au respect des **mesures d'hygiène** (se laver les mains plusieurs fois par jour à l'eau et au savon ; éternuer dans un mouchoir jetable, immédiatement jeté dans une poubelle fermée avec lavage des mains juste après ; ne pas partager les ustensiles pour manger et boire, ni les brosses à dents ou les essuies) et autant que possible de **distanciation physique** (se tenir à 1,5m des autres, éviter les contacts directs et les échanges d'objets).
- Vous devrez **être attentif et surveiller l'apparition éventuelle de tout symptôme** tels que : fièvre, autres plaintes d'infection virale aiguë (toux, difficultés respiratoires, rhume, maux de gorge, fièvre, maux de tête, douleurs musculaires, douleur thoracique, perte d'odorat ou de goût, diarrhée aqueuse sans cause apparente) ou aggravation de symptômes respiratoires chroniques (asthme, toux chronique, allergie). En cas d'apparition d'un symptôme, contactez votre médecin par téléphone pour l'informer des symptômes et du contact récent, et voir avec lui si un test est requis.
- Un test systématique chez un enfant de maternelle qui ne présente pas de symptôme n'est pas indiqué.

Nous restons à votre disposition pour toute question à ce sujet.

**Signature :**



Chers parents,

**Deux ou plusieurs enfants du groupe de votre enfant présentent ou ont présenté une infection Covid-19 endéans les 14 jours qui viennent de s'écouler.** Dans ce cas, la procédure prévoit que l'ensemble des enfants du groupe soient mis **en quarantaine** à la maison pour une durée de **7 jours à partir du dernier contact à risque**, même s'ils ne sont pas malades. Cette mesure vise à surveiller leur état de santé, et empêcher la transmission du virus à d'autres personnes.

Dès lors :

- Votre enfant **doit être en quarantaine jusqu'au ...../...../..... inclus.**
- Il peut ensuite, au 8<sup>ème</sup> jour, retourner à l'école, et fréquenter l'accueil extrascolaire avant, après l'école et le mercredi après-midi.

Voici les consignes à suivre durant les **14 jours** qui suivent le dernier contact avec la personne infectée, à savoir **jusqu'au ...../...../.....** :

- Il est recommandé de **réduire au minimum les autres contacts sociaux** pendant 14 jours, en respectant une distance de 1,5m, et **d'éviter les contacts avec les personnes à risque** de développer des formes plus sévères de la maladie comme par exemple les personnes de l'entourage familial âgées de plus de 65 ans (grands-parents) ou porteurs d'une maladie chronique. De même, les **activités extra-scolaires**, loisirs, académies doivent être évitées. **Dès lors, nous suspendons sa participation aux activités du patro durant 14 jours et celle-ci reprendra le ...../...../.....**
- Veillez au respect des **mesures d'hygiène** (se laver les mains plusieurs fois par jour à l'eau et au savon ; éternuer dans un mouchoir jetable, immédiatement jeté dans une poubelle fermée avec lavage des mains juste après ; ne pas partager les ustensiles pour manger et boire, ni les brosses à dents ou les essuies) et autant que possible de **distanciation physique** (se tenir à 1,5m des autres, éviter les contacts directs et les échanges d'objets).
- Vous devrez **être attentif et surveiller l'apparition éventuelle de tout symptôme** tels que : fièvre, autres plaintes d'infection virale aiguë (toux, difficultés respiratoires, rhume, maux de gorge, fièvre, maux de tête, douleurs musculaires, douleur thoracique, perte d'odorat ou de goût, diarrhée aqueuse sans cause apparente) ou aggravation de symptômes respiratoires chroniques (asthme, toux chronique, allergie). **En cas d'apparition d'un symptôme**, contactez votre médecin par téléphone pour l'informer des symptômes et du contact récent, et voir avec lui si un test est requis.
- Un test systématique chez un enfant fréquentant l'école maternelle qui ne présente pas de symptôme n'est pas indiqué.

Nous restons à votre disposition pour toute question à ce sujet.

**Signature :**



Animés  
de 6 à 12  
ans



Autre  
animé  
Covid+



Tous les  
cas de  
figure



Responsables  
légaux de  
l'animé

Chers parents,

**Deux ou plusieurs enfants du groupe de votre enfant présentent ou ont présenté une infection Covid-19 endéans les 14 jours qui viennent de s'écouler.** Dans ce cas, la procédure prévoit que l'ensemble des enfants du groupe soient mis **en quarantaine** à la maison pour une durée de **7 jours à partir du dernier contact à risque**, même s'ils ne sont pas malades. Cette mesure vise à surveiller leur état de santé, et empêcher la transmission du virus à d'autres personnes.

Dès lors :

- Votre enfant **doit être en quarantaine jusqu'au ...../...../..... inclus.**
- Il peut ensuite, au 8<sup>ème</sup> jour, retourner à l'école, et fréquenter l'accueil extrascolaire avant, après l'école et le mercredi après-midi.

Voici les consignes à suivre durant les **14 jours** qui suivent le dernier contact avec la personne infectée, à savoir **jusqu'au ...../...../.....** :

- Il est recommandé de **réduire au minimum les autres contacts sociaux** pendant 14 jours, en respectant une distance de 1,5m, et **d'éviter les contacts avec les personnes à risque** de développer des formes plus sévères de la maladie comme par exemple les personnes de l'entourage familial âgées de plus de 65 ans (grands-parents) ou porteurs d'une maladie chronique. De même, les **activités extra-scolaires**, loisirs, académies doivent être évitées. **Dès lors, nous suspendons sa participation aux activités du patro durant 14 jours et celle-ci reprendra le ...../...../.....**
- Veillez au respect des **mesures d'hygiène** (se laver les mains plusieurs fois par jour à l'eau et au savon ; éternuer dans un mouchoir jetable, immédiatement jeté dans une poubelle fermée avec lavage des mains juste après ; ne pas partager les ustensiles pour manger et boire, ni les brosses à dents ou les essuies) et autant que possible de **distanciation physique** (se tenir à 1,5m des autres, éviter les contacts directs et les échanges d'objets).
- Vous devrez **être attentif et surveiller l'apparition éventuelle de tout symptôme** tels que : fièvre, autres plaintes d'infection virale aiguë (toux, difficultés respiratoires, rhume, maux de gorge, fièvre, maux de tête, douleurs musculaires, douleur thoracique, perte d'odorat ou de goût, diarrhée aqueuse sans cause apparente) ou aggravation de symptômes respiratoires chroniques (asthme, toux chronique, allergie). **En cas d'apparition d'un symptôme**, contactez votre médecin par téléphone pour l'informer des symptômes et du contact récent, et voir avec lui si un test est requis.
- Un test systématique chez un enfant fréquentant l'école maternelle qui ne présente pas de symptôme n'est pas indiqué.

Nous restons à votre disposition pour toute question à ce sujet.

**Signature :**

5



Animés  
de 6 à 12  
ans



Animateur  
de l'animé  
Covid+



Contact  
faible  
risque



Responsables  
légaux de  
l'animé

Chers parents,

**Un animateur qui fréquente le groupe de votre enfant a une infection Covid-19.** Suite à l'analyse de la situation qui a été faite par le responsable de la santé et des soins, il apparaît que votre enfant n'a pas eu de contact étroit avec cette personne et est estimé comme étant à **faible risque** d'avoir été contaminé. **Il peut donc continuer à fréquenter l'école, l'école de devoirs, l'accueil extrascolaire avant, après l'école et le mercredi après-midi.**

Néanmoins, quelques mesures de précautions sont nécessaires pour suivre son état de santé et éviter la propagation du virus. Voici les consignes à suivre durant les **14 jours** qui suivent le dernier contact avec la personne infectée, à savoir **jusqu'au ...../...../.....** :

- Il est recommandé de **réduire au minimum les autres contacts sociaux** pendant 14 jours, en respectant une distance de 1,5m, et d'**éviter les contacts** avec **les personnes à risque** de développer des formes plus sévères de la maladie comme par exemple les personnes de l'entourage familial âgées de plus de 65 ans (grands-parents) ou porteurs d'une maladie chronique. De même, les **activités extra-scolaires**, loisirs, académies doivent être évitées. **Dès lors, nous suspendons sa participation aux activités du patro durant 14 jours et celle-ci reprendra le ...../...../.....**
- Veillez au respect des **mesures d'hygiène** (se laver les mains plusieurs fois par jour à l'eau et au savon ; éternuer dans un mouchoir jetable, immédiatement jeté dans une poubelle fermée avec lavage des mains juste après ; ne pas partager les ustensiles pour manger et boire, ni les brosses à dents ou les essuies) et autant que possible de **distanciation physique** (se tenir à 1,5m des autres, éviter les contacts directs et les échanges d'objets).
- Vous devrez **être attentif et surveiller l'apparition éventuelle de tout symptôme** tels que : fièvre, autres plaintes d'infection virale aiguë (toux, difficultés respiratoires, rhume, maux de gorge, fièvre, maux de tête, douleurs musculaires, douleur thoracique, perte d'odorat ou de goût, diarrhée aqueuse sans cause apparente) ou aggravation de symptômes respiratoires chroniques (asthme, toux chronique, allergie). En cas d'apparition d'un symptôme, contactez votre médecin par téléphone pour l'informer des symptômes et du contact récent, et voir avec lui si un test est requis.

Nous restons à votre disposition pour toute question à ce sujet.

**Signature :**



Animés  
de 6 à 12  
ans



Animateur  
de l'animé  
Covid+



Contact  
haut  
risque



Responsables  
légaux **et médecin**  
traitant de l'animé

Chers parents,

**Un animateur qui fréquente le groupe de votre enfant a une infection Covid-19.** Suite à l'analyse de la situation qui a été faite par le responsable de la santé et des soins, (**identification des « contacts étroits » du/des enfants** ➔), votre enfant est estimé comme étant un **« contact étroit »**, et donc à plus haut risque d'avoir été contaminé. La procédure prévoit, dans ce cas, qu'il soit mis **en quarantaine** à la maison pour une durée de **7 jours à partir du dernier contact à risque**, s'il ne présente pas de symptômes.

Si l'enfant développe des symptômes, il peut être testé sur avis du médecin :

Selon les procédures de Sciensano en vigueur depuis le 1<sup>er</sup> octobre, votre enfant doit donc :

- **Rester à la maison à partir du ...../...../.....**, pour minimum 7 jours.
- Être testé **au minimum au 5<sup>ème</sup> jour de sa quarantaine (Prenez rdv dès maintenant !)**.
  - Si le **test est positif**, la quarantaine est reconduite de 7 jours, à compter du jour du test, s'il ne développe pas de symptômes.
  - Si le **test est négatif**, la quarantaine s'arrête au 7<sup>ème</sup> jour, et votre enfant peut ensuite, au 8<sup>ème</sup> jour, retourner à l'école, et fréquenter l'école de devoirs, l'accueil extrascolaire avant, après l'école et le mercredi après-midi.
  - Si le **résultat** du test n'est **pas disponible** à la fin des 7 jours de quarantaine : la quarantaine est prolongée jusqu'à connaissance du résultat du test
  - En cas de **refus du test**, la quarantaine est de 10 jours → quarantaine jusqu'au ...../...../.....

Voici les consignes à suivre durant les **14 jours** qui suivent le dernier contact avec la personne infectée, à savoir **jusqu'au ...../...../.....** :

- Il est recommandé de **réduire au minimum les autres contacts sociaux** pendant 14 jours, en respectant une distance de 1,5m, et d'**éviter les contacts** avec **les personnes à risque** de développer des formes plus sévères de la maladie comme par exemple les personnes de l'entourage familial âgées de plus de 65 ans (grands-parents) ou porteurs d'une maladie chronique. De même, les **activités extra-scolaires**, loisirs, académies doivent être évitées. **Dès lors, nous suspendons sa participation aux activités du patro durant 14 jours et celle-ci reprendra le ...../...../.....**
- Veillez au respect des **mesures d'hygiène** (se laver les mains plusieurs fois par jour à l'eau et au savon ; éternuer dans un mouchoir jetable, immédiatement jeté dans une poubelle fermée avec lavage des mains juste après ; ne pas partager les ustensiles pour manger et boire, ni les brosses à dents ou les essuies) et autant que possible de **distanciation physique** (se tenir à 1,5m des autres, éviter les contacts directs et les échanges d'objets).



- Vous devrez **être attentif et surveiller l'apparition éventuelle de tout symptôme** tels que : fièvre, autres plaintes d'infection virale aiguë (toux, difficultés respiratoires, rhume, maux de gorge, fièvre, maux de tête, douleurs musculaires, douleur thoracique, perte d'odorat ou de goût, diarrhée aqueuse sans cause apparente) ou aggravation de symptômes respiratoires chroniques (asthme, toux chronique, allergie). **En cas d'apparition d'un symptôme**, Contactez votre médecin par téléphone pour l'informer des symptômes et du contact récent.

Nous restons à votre disposition pour toute question à ce sujet.

**Signature :**



Animés  
de 6 à 12  
ans



Cluster !  
2 animés  
Covid+



Contact  
haut  
risque



Responsables  
légaux **et médecin**  
traitant de l'animé

Chers parents,

**Deux animés ou plus du groupe de votre enfant (ou un animé et un animateur) présentent ou ont présenté une infection Covid-19 endéans les 14 jours.** Dans ce cas, et suite à l'analyse qui a été faite par le responsable de la santé et des soins, **en collaboration avec les inspecteurs d'hygiène régionaux** → (suspicion de transmission dans le groupe), la procédure prévoit que **l'ensemble des enfants du groupe** soient mis **en quarantaine** à la maison pour une durée de **7 jours à partir du dernier contact à risque**, même s'ils ne sont pas malades, et que chacun **bénéficie d'un test**. Cette mesure vise à surveiller leur état de santé, et empêcher la transmission du virus à d'autres personnes.

Selon les procédures de Sciensano en vigueur depuis le 1<sup>er</sup> octobre, votre enfant doit donc :

- **Rester à la maison à partir du ...../...../.....**, pour minimum 7 jours.
- Être testé **au minimum au 5<sup>ème</sup> jour de sa quarantaine (Prenez rdv dès maintenant !)**.
  - Si le **test** est **positif**, la quarantaine est reconduite de 7 jours, à compter du jour du test, s'il ne développe pas de symptômes.
  - Si le **test** est **négatif**, la quarantaine s'arrête au 7<sup>ème</sup> jour.
  - Si le **résultat** du test n'est **pas disponible** à la fin des 7 jours de quarantaine : la quarantaine est prolongée jusqu'à connaissance du résultat du test
  - En cas de **refus du test**, la quarantaine est de 10 jours → quarantaine jusqu'au ...../...../.....

Voici les consignes à suivre durant les **14 jours** qui suivent le dernier contact avec la personne infectée, à savoir **jusqu'au ...../...../.....** :

- Il est recommandé de **réduire au minimum les autres contacts sociaux** pendant 14 jours, en respectant une distance de 1,5m, et d'**éviter les contacts** avec **les personnes à risque** de développer des formes plus sévères de la maladie comme par exemple les personnes de l'entourage familial âgées de plus de 65 ans (grands-parents) ou porteurs d'une maladie chronique. De même, les **activités extra-scolaires**, loisirs, académies doivent être évitées. **Dès lors, nous suspendons sa participation aux activités du patro durant 14 jours et celle-ci reprendra le ...../...../.....**
- Veillez au respect des **mesures d'hygiène** (se laver les mains plusieurs fois par jour à l'eau et au savon ; éternuer dans un mouchoir jetable, immédiatement jeté dans une poubelle fermée avec lavage des mains juste après ; ne pas partager les ustensiles pour manger et boire, ni les brosses à dents ou les essuies) et autant que possible de **distanciation physique** (se tenir à 1,5m des autres, éviter les contacts directs et les échanges d'objets).

→ Vous devrez **être attentif et surveiller l'apparition éventuelle de tout symptôme** tels que : fièvre, autres plaintes d'infection virale aiguë (toux, difficultés respiratoires, rhume, maux de gorge, fièvre, maux de tête, douleurs musculaires, douleur thoracique, perte d'odorat ou de goût, diarrhée aqueuse sans cause apparente) ou aggravation de symptômes respiratoires chroniques (asthme, toux chronique, allergie). **En cas d'apparition d'un symptôme**, contactez votre médecin par téléphone pour l'informer des symptômes et du contact récent.

Nous restons à votre disposition pour toute question à ce sujet.

**Signature :**



Animés de 12 ans et plus et animateurs



Autre(s) animé(s) Covid+



Contact faible risque



Responsables légaux de l'animé

Chers parents,

**Un ou deux enfants qui fréquente/nt le groupe de votre enfant présente/nt une infection Covid-19.** Suite à l'analyse de la situation qui a été faite par le responsable de la santé et des soins (**identification des « contacts étroits » du/des enfants** →), votre enfant est estimé comme étant à **faible risque** d'avoir été contaminé. **Il peut donc continuer à fréquenter l'école, l'école de devoirs, l'accueil extrascolaire avant, après l'école et le mercredi après-midi.**

Néanmoins, quelques mesures de précautions sont nécessaires pour suivre son état de santé et éviter la propagation du virus. Voici les consignes à suivre durant les 14 jours qui suivent le dernier contact avec la personne infectée, à savoir **jusqu'au ...../...../.....** :

- Il est recommandé de **réduire au minimum les autres contacts sociaux** pendant 14 jours, en respectant une distance de 1,5m, et **d'éviter les contacts** avec les **personnes à risque** de développer des formes plus sévères de la maladie comme par exemple les personnes de l'entourage familial âgées de plus de 65 ans (grands-parents) ou porteurs d'une maladie chronique. De même, les **activités extra-scolaires**, loisirs, académies doivent être évitées. **Dès lors, nous suspendons sa participation aux activités du patro durant 14 jours et celle-ci reprendra le ...../...../.....**
- Veillez au respect des **mesures d'hygiène** (se laver les mains plusieurs fois par jour à l'eau et au savon ; éternuer dans un mouchoir jetable, immédiatement jeté dans une poubelle fermée avec lavage des mains juste après ; ne pas partager les ustensiles pour manger et boire, ni les brosses à dents ou les essuies) et autant que possible de **distanciation physique** (se tenir à 1,5m des autres, éviter les contacts directs et les échanges d'objets).
- Vous devrez **être attentif et surveiller l'apparition éventuelle de tout symptôme** tels que : fièvre, autres plaintes d'infection virale aigüe (toux, difficultés respiratoires, rhume, maux de gorge, fièvre, maux de tête, douleurs musculaires, douleur thoracique, perte d'odorat ou de goût, diarrhée aqueuse sans cause apparente) ou aggravation de symptômes respiratoires chroniques (asthme, toux chronique, allergie). **En cas d'apparition d'un symptôme**, contactez votre médecin par téléphone pour l'informer des symptômes et du contact récent, et voir avec lui si un test est requis.

Nous restons à votre disposition pour toute question à ce sujet.

**Signature :**



Chers parents,

**Un ou deux enfants qui fréquente/nt le groupe de votre enfant présente/nt une infection Covid-19.** Suite à l'analyse de la situation qui a été faite par le responsable de la santé et des soins (**identification des « contacts étroits » du/des enfants** ➔), votre enfant est estimé comme étant un « **contact étroit** », et donc à plus haut risque d'avoir été contaminé. La procédure prévoit, dans ce cas, qu'il soit mis **en quarantaine** à la maison pour une durée de **7 jours à partir du dernier contact à risque**, s'il ne présente pas de symptômes.

Si l'enfant développe des symptômes, il peut être testé sur avis du médecin :

Selon les procédures de Sciensano en vigueur depuis le 1er octobre, votre enfant doit donc :

- **Rester à la maison à partir du ...../...../.....** pour minimum 7 jours.
- Être testé **au minimum au 5<sup>ème</sup> jour de sa quarantaine (Prenez rdv dès maintenant !)**.
  - Si le **test** est **positif**, la quarantaine est reconduite de 7 jours, à compter du jour du test, s'il ne développe pas de symptômes.
  - Si le **test** est **négatif**, la quarantaine s'arrête au 7<sup>ème</sup> jour, et votre enfant peut ensuite, au 8<sup>ème</sup> jour, retourner à l'école, et fréquenter l'école de devoirs, l'accueil extrascolaire avant, après l'école et le mercredi après-midi.
  - Si le **résultat** du test n'est **pas disponible** à la fin des 7 jours de quarantaine : la quarantaine est prolongée jusqu'à connaissance du résultat du test
  - En cas de **refus du test**, la quarantaine est de 10 jours → quarantaine jusqu'au ...../...../.....

Voici les consignes à suivre durant les **14 jours** qui suivent le dernier contact avec la personne infectée, à savoir jusqu'au ...../...../..... :

- Il est recommandé de **réduire au minimum les autres contacts sociaux** pendant 14 jours, en respectant une distance de 1,5m, et **d'éviter les contacts avec les personnes à risque** de développer des formes plus sévères de la maladie comme par exemple les personnes de l'entourage familial âgées de plus de 65 ans (grands-parents) ou porteurs d'une maladie chronique. De même, les **activités extra-scolaires**, loisirs, académies doivent être évitées. **Dès lors, nous suspendons sa participation aux activités du patro durant 14 jours et celle-ci reprendra le ...../...../.....**
- Veillez au respect des **mesures d'hygiène** (se laver les mains plusieurs fois par jour à l'eau et au savon ; éternuer dans un mouchoir jetable, immédiatement jeté dans une poubelle fermée avec lavage des mains juste après ; ne pas partager les ustensiles pour manger et boire, ni les brosses à dents ou les essuies) et autant que possible de **distanciation physique** (se tenir à 1,5m des autres, éviter les contacts directs et les échanges d'objets).

→ Vous devrez **être attentif et surveiller l'apparition éventuelle de tout symptôme** tels que : fièvre, autres plaintes d'infection virale aiguë (toux, difficultés respiratoires, rhume, maux de gorge, fièvre, maux de tête, douleurs musculaires, douleur thoracique, perte d'odorat ou de goût, diarrhée aqueuse sans cause apparente) ou aggravation de symptômes respiratoires chroniques (asthme, toux chronique, allergie). **En cas d'apparition d'un symptôme**, contactez votre médecin par téléphone pour l'informer des symptômes et du contact récent.

Nous restons à votre disposition pour toute question à ce sujet.

**Signature :**



Chers parents,

**Un animateur qui fréquente le groupe de votre enfant a une infection Covid-19.** Suite à l'analyse de la situation qui a été faite par le responsable de la santé et des soins, il apparaît que votre enfant n'a pas eu de contact étroit avec cette personne et est estimé comme étant à **faible risque** d'avoir été contaminé. **Il peut donc continuer à fréquenter l'école, les écoles de devoirs, l'accueil extrascolaire avant, après l'école et le mercredi après-midi.**

Néanmoins, quelques mesures de précautions sont nécessaires pour suivre son état de santé et éviter la propagation du virus. Voici les consignes à suivre durant les **14 jours** qui suivent le dernier contact avec la personne infectée, à savoir **jusqu'au ...../...../.....** :

- Il est recommandé de **réduire au minimum les autres contacts sociaux** pendant 14 jours, en respectant une distance de 1,5m, et **d'éviter les contacts** avec les **personnes à risque** de développer des formes plus sévères de la maladie comme par exemple les personnes de l'entourage familial âgées de plus de 65 ans (grands-parents) ou porteurs d'une maladie chronique. De même, les **activités extra-scolaires**, loisirs, académies doivent être évitées. **Dès lors, nous suspendons sa participation aux activités du patro durant 14 jours et celle-ci reprendra le ...../...../.....**
- Veillez au respect des **mesures d'hygiène** (se laver les mains plusieurs fois par jour à l'eau et au savon ; éternuer dans un mouchoir jetable, immédiatement jeté dans une poubelle fermée avec lavage des mains juste après ; ne pas partager les ustensiles pour manger et boire, ni les brosses à dents ou les essuies) et autant que possible de **distanciation physique** (se tenir à 1,5m des autres, éviter les contacts directs et les échanges d'objets).
- Vous devrez **être attentif et surveiller l'apparition éventuelle de tout symptôme** tels que : fièvre, autres plaintes d'infection virale aiguë (toux, difficultés respiratoires, rhume, maux de gorge, fièvre, maux de tête, douleurs musculaires, douleur thoracique, perte d'odorat ou de goût, diarrhée aqueuse sans cause apparente) ou aggravation de symptômes respiratoires chroniques (asthme, toux chronique, allergie). **En cas d'apparition d'un symptôme**, contactez votre médecin par téléphone pour l'informer des symptômes et du contact récent, et voir avec lui si un test est requis.

Nous restons à votre disposition pour toute question à ce sujet.

**Signature :**



Animés de 12 ans et plus et animateurs



Animateur de l'animé Covid+



Contact haut risque



Responsables légaux **et médecin traitant** de l'animé

Chers parents,

**Un animateur qui fréquente le groupe de votre enfant a une infection Covid-19.** Suite à l'analyse de la situation qui a été faite par le responsable de la santé et des soins, (**identification des « contacts étroits » du/des enfants** ➔), votre enfant est estimé comme étant un « **contact étroit** », et donc à plus haut risque d'avoir été contaminé. La procédure prévoit, dans ce cas, qu'il soit mis **en quarantaine** à la maison pour une durée de **7 jours à partir du dernier contact à risque**, s'il ne présente pas de symptômes.

Si l'enfant développe des symptômes, il peut être testé sur avis du médecin :

Selon les procédures de Sciensano en vigueur depuis le 1<sup>er</sup> octobre, votre enfant doit donc :

- ➔ **Rester à la maison à partir du ...../...../....., pour minimum 7 jours.**
- ➔ Être testé **au minimum au 5<sup>ème</sup> jour de sa quarantaine (Prenez rdv dès maintenant !)**.
  - Si le **test** est **positif**, la quarantaine est reconduite de 7 jours, à compter du jour du test, s'il ne développe pas de symptômes.
  - Si le **test** est **négatif**, la quarantaine s'arrête au 7<sup>ème</sup> jour, et votre enfant peut ensuite, au 8<sup>ème</sup> jour, retourner à l'école, et fréquenter l'école de devoirs, l'accueil extrascolaire avant, après l'école et le mercredi après-midi.
  - Si le **résultat** du test n'est **pas disponible** à la fin des 7 jours de quarantaine : la quarantaine est prolongée jusqu'à connaissance du résultat du test
  - En cas de **refus du test**, la quarantaine est de 10 jours ➔ quarantaine jusqu'au ...../...../.....

Voici les consignes à suivre durant les **14 jours** qui suivent le dernier contact avec la personne infectée, à savoir **jusqu'au ...../...../.....** :

- ➔ Il est recommandé de **réduire au minimum les autres contacts sociaux** pendant 14 jours, en respectant une distance de 1,5m, et **d'éviter les contacts** avec les **personnes à risque** de développer des formes plus sévères de la maladie comme par exemple les personnes de l'entourage familial âgées de plus de 65 ans (grands-parents) ou porteurs d'une maladie chronique. De même, les activités extra-scolaires, loisirs, académies doivent être évitées. **Dès lors, nous suspendons sa participation aux activités du patro durant 14 jours et celle-ci reprendra le ...../...../.....**
- ➔ Veillez au respect des **mesures d'hygiène** (se laver les mains plusieurs fois par jour à l'eau et au savon ; éternuer dans un mouchoir jetable, immédiatement jeté dans une poubelle fermée avec lavage des mains juste après ; ne pas partager les ustensiles pour manger et boire, ni les brosses à dents ou les essuies) et autant que possible de **distanciation physique** (se tenir à 1,5m des autres, éviter les contacts directs et les échanges d'objets).



→ Vous devrez **être attentif et surveiller l'apparition éventuelle de tout symptôme** tels que : fièvre, autres plaintes d'infection virale aiguë (toux, difficultés respiratoires, rhume, maux de gorge, fièvre, maux de tête, douleurs musculaires, douleur thoracique, perte d'odorat ou de goût, diarrhée aqueuse sans cause apparente) ou aggravation de symptômes respiratoires chroniques (asthme, toux chronique, allergie). **En cas d'apparition d'un symptôme**, contactez votre médecin par téléphone pour l'informer des symptômes et du contact récent.

Nous restons à votre disposition pour toute question à ce sujet !

**Signature**



Animés de 12 ans et plus et animateurs



Cluster !  
2 animés Covid+



Tous les cas de figure



Responsables légaux **et médecin traitant** de l'animé

Chers parents,

**Deux ou plusieurs enfants du groupe de votre enfant présentent ou ont présenté une infection Covid-19 endéans les 14 jours.** Dans ce cas, et suite à l'analyse qui a été faite par le responsable de la santé et des soins, **en collaboration avec les inspecteurs d'hygiène régionaux** → (suspicion de transmission dans le groupe), la procédure prévoit que **l'ensemble des enfants du groupe** soient mis **en quarantaine** à la maison pour une durée de **7 jours à partir du dernier contact à risque**, même s'ils ne sont pas malades, et que chacun bénéficie d'un test. Cette mesure vise à surveiller leur état de santé, et empêcher la transmission du virus à d'autres personnes.

Selon les procédures de Sciensano en vigueur depuis le 1<sup>er</sup> octobre, votre enfant doit donc :

- **Rester à la maison à partir du ...../...../.....**, pour minimum 7 jours.
- Être testé **au minimum au 5<sup>ème</sup> jour de sa quarantaine (Prenez rdv dès maintenant !)**.
  - Si le **test** est **positif**, la quarantaine est reconduite de 7 jours, à compter du jour du test, s'il ne développe pas de symptômes.
  - Si le **test** est **négatif**, la quarantaine s'arrête au 7<sup>ème</sup> jour.
  - Si le **résultat** du test n'est **pas disponible** à la fin des 7 jours de quarantaine : la quarantaine est prolongée jusqu'à connaissance du résultat du test
  - En cas de **refus du test**, la quarantaine est de 10 jours → quarantaine jusqu'au ...../...../.....

Voici les consignes à suivre durant les **14 jours** qui suivent le dernier contact avec la personne infectée, à savoir **jusqu'au ...../...../.....** :

- Il est recommandé de **réduire au minimum les autres contacts sociaux** pendant 14 jours, en respectant une distance de 1,5m, et **d'éviter les contacts** avec les **personnes à risque** de développer des formes plus sévères de la maladie comme par exemple les personnes de l'entourage familial âgées de plus de 65 ans (grands-parents) ou porteurs d'une maladie chronique. De même, les **activités extra-scolaires**, loisirs, académies doivent être évitées. **Dès lors, nous suspendons sa participation aux activités du patro durant 14 jours et celle-ci reprendra le ...../...../.....**
- Veillez au respect des **mesures d'hygiène** (se laver les mains plusieurs fois par jour à l'eau et au savon ; éternuer dans un mouchoir jetable, immédiatement jeté dans une poubelle fermée avec lavage des mains juste après ; ne pas partager les ustensiles pour manger et boire, ni les brosses à dents ou les essuies) et autant que possible de **distanciation physique** (se tenir à 1,5m des autres, éviter les contacts directs et les échanges d'objets).

- Vous devrez **être attentif et surveiller l'apparition éventuelle de tout symptôme** tels que : fièvre, autres plaintes d'infection virale aiguë (toux, difficultés respiratoires, rhume, maux de gorge, fièvre, maux de tête, douleurs musculaires, douleur thoracique, perte d'odorat ou de goût, diarrhée aqueuse sans cause apparente) ou aggravation de symptômes respiratoires chroniques (asthme, toux chronique, allergie). **En cas d'apparition d'un symptôme**, contactez votre médecin par téléphone pour l'informer des symptômes et du contact récent.

Nous restons à votre disposition pour toute question à ce sujet !

**Signature**